

レジメン名	CAPOX アジュバント
対象疾患	結腸・直腸癌における補助化学療法
1クールの日数	21日
目標コース数	4コース

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ゼローダ	Cape	下記参照		po		d1夕～d15朝
2	エルプラット	L-OHP	130	mg/m ²	div	2時間	d1
3							
4							
5							
6							
補足	ゼローダ錠の1日量 (B法) …1.33m ² 未満：3000mg 1.33m ² 以上1.57m ² 未満：3600mg 1.57m ² 以上1.81m ² 未満：4200mg 1.81m ² 以上：4800mg						

催吐リスク	中等度
前投薬	アロキシ注0.75mg、デカドロン注4.95mg、プロイメンド注150mg
減量規定	ゼローダ：血液毒性 (Grade3以上)、非血液毒性 (Grade2以上) の発現ある場合は休薬。再開時は減量基準を参考に投与再開。 エルプラット：有害事象 (Grade3以上) の発現ある場合は休薬。再開時は減量基準を参考に投与再開。
主な副作用	手足症候群、末梢神経障害、悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、口内炎
参考文献	適正使用ガイド (ゼローダ、エルプラット) 制吐薬適正使用ガイドライン (日本癌治療学会)
その他	

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL アロキシ注0.75mg デカドロン注1.65mg 1日1回	1本 1本 3本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL プロイメンド注150mg 1日1回	1本 1本	30分
4	点滴末梢 メイン1側管1 5%ブドウ糖液250mL エルプラット注 1日1回 投与前30分空ける	1本 130mg/m ²	2時間