

レジメン名	IRI
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発胃癌
1クールの日数	14日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	イリノテカン	IRI	150	mg/m ²	div	90分	d1
2							
3							
4							
5							
6							
補足							

催吐リスク	中等度
前投薬	グラニセトロン注3mg、デカドロン注9.9mg
減量規定	イリノテカン：白血球数3000/mm ³ 未満または血小板数100,000/mm ³ 未満の場合には、投与を中止または延期
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、下痢、倦怠感、脱毛
参考文献	適正使用ガイド（カンプト） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg デカドロン注1.65mg 1日1回	1本 1本 2本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 5%ブドウ糖液500mL イリノテカン注 1日1回	1本 150mg/m ²	90分