

レジメン名	DTX
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発胃癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	DTX	60	mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	d1
2							
3							
4							
5							
6							
補足	1回最高用量は75mg/m <sup>2</sup> まで						

催吐リスク	軽度
前投薬	デカドロン注6.6mg
減量規定	好中球数2000/m <sup>3</sup> 未満の場合、投与を延期 減量目安：初回60mg/m <sup>2</sup> の場合 1段階減量…50mg/m <sup>2</sup> 、2段階減量…休薬 初回70または75mg/m <sup>2</sup> の場合 1段階減量…60mg/m <sup>2</sup> 、2段階減量…50mg/m <sup>2</sup>
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫、口内炎
参考文献	適正使用ガイド（ドセタキセル「サワイ」） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day ( 1 )			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL  1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL デカドロン注6.6mg  1日1回	1本 1本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 5%ブドウ糖液250mL ドセタキセル注  1日1回	1本 60mg/m <sup>2</sup>	1時間