

レジメン名	TC アジュバント
対象疾患	乳癌 アジュバント
1クールの日数	21日
目標コース数	4コース

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	DTX	75	mg/m ²	div	1時間	d1
2	エンドキサン	CPA	600	mg/m ²	div	30分	d1
3							
4							
5							
6							
補足							

催吐リスク	中等度
前投薬	グラニセトン注3mg、デカドロン注9.9mg
減量規定	好中球数2000/mm ³ 未満の場合、投与を延期 減量目安：初回70または75mg/m ² の場合 1段階減量…60mg/m ² 、2段階減量…50mg/m ²
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫、口内炎、出血性膀胱炎
参考文献	適正使用ガイド（ドセタキセル「サワイ」） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg デカドロン注1.65mg 1日1回	1本 1本 2本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL ドセタキセル注 1日1回	1本 75mg/m ²	1時間
4	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL エンドキサン注 1日1回	1本 600mg/m ²	30分