

| | |
|---------|-----------------|
| レジメン名 | TC+Tmab アジュバント |
| 対象疾患 | HER2陽性乳癌 アジュバント |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 目標コース数 | TC：4コース Tmab：1年 |

| | 抗がん剤名 | 略号 | 1日投与量 | 単位 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|--|------|-------|-------------------|------|------|-----|
| 1 | ドセタキセル | DTX | 75 | mg/m ² | div | 1時間 | d1 |
| 2 | エンドキサン | CPA | 600 | mg/m ² | div | 30分 | d1 |
| 3 | ハーセプチン | Tmab | 下記参照 | mg/kg | div | 下記参照 | d1 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 補足 | ハーセプチン…初回8mg/kgを90分かけて投与。 2回目以降6mg/kg。忍容性あれば30分まで短縮可。 | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 催吐リスク | 中等度 |
| 前投薬 | グラニセトロン注3mg、デカドロン注9.9mg |
| 減量規定 | 好中球数2000/mm ³ 未満の場合、投与を延期 減量目安：初回70または75mg/m ² の場合 1段階減量…60mg/m ² 、2段階減量…50mg/m ² |
| 主な副作用 | 悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫、口内炎、出血性膀胱炎、心障害、Infusion reaction |
| 参考文献 | 適正使用ガイド（ドセタキセル「サワイ」、ハーセプチン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会） |
| その他 | |

投与スケジュール

| Day (1) | | | |
|-----------|---|----------------------------|----------------|
| 滴下順 | 手技・薬品名・規格 | 用量 | 投与時間 |
| 1 | 点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続) | 1本 | 持続 |
| 2 | 点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg デカドロン注1.65mg 1日1回 | 1本 1本 2本 | 15分 |
| 3 | 点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL ドセタキセル注 1日1回 | 1本 75mg/m ² | 1時間 |
| 4 | 点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL エンドキサン注 1日1回 | 1本 600mg/m ² | 30分 |
| 5 | 点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL ハーセプチン注 1日1回 | 1本 初回8mg/kg 以降6mg/kg | 初回90分 以降30分 |