

レジメン名	Eriburin
対象疾患	進行再発乳癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ハラヴェン		1.4	mg/m ²	div	2~5分	d1,8
2							
3							
4							
5							
6							
補足							

催吐リスク	軽度
前投薬	
減量規定	7日間を超えて持続する好中球数減少（500/mm ³ 未満）、発熱又は感染を伴う好中球数減少（1,000/mm ³ 未満）、血小板数減少（25,000/mm ³ 未満）、輸血を要する血小板数減少（50,000/mm ³ 未満）、非血液毒性（Grade3以上）、副作用等により2週目に休薬した場合 減量目安：1段階減量…1.1mg/m ² 、2段階減量…0.7mg/m ²
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、口内炎、倦怠感
参考文献	適正使用ガイド（ハラヴェン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	0.01mg/mL未満の濃度に希釈しない

投与スケジュール

Day (1,8)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL ハラヴェン注 1日1回	20mL 1.4mg/m ²	2~5分 (全開)