

|         |         |
|---------|---------|
| レジメン名   | Tmab    |
| 対象疾患    | 全乳癌     |
| 1クールの日数 | 7日      |
| 目標コース数  | 可能な限り継続 |

|    | 抗がん剤名  | 略号   | 1日投与量 | 単位    | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|--|------|-------|-------|------|------|-----|
| 1  | ハーセプチン   | Tmab | 下記参照  | mg/kg | div  | 下記参照 | d1  |
| 2  |  |      |       |       |      |      |     |
| 3  |  |      |       |       |      |      |     |
| 4  |  |      |       |       |      |      |     |
| 5  |  |      |       |       |      |      |     |
| 6  |  |      |       |       |      |      |     |
| 補足 | ハーセプチン…初回4mg/kgを90分かけて投与。<br>2回目以降2mg/kg。忍容性あれば30分まで短縮可。 |      |       |       |      |      |     |

|       |   |
|-------|---|
| 催吐リスク | 最小度                                       |
| 前投薬   | ポララミン注5mg                                 |
| 減量規定  | 減量基準なし                                    |
| 主な副作用 | 悪心・嘔吐、倦怠感、心障害、Infusion reaction           |
| 参考文献  | 適正使用ガイド（ハーセプチン）<br>制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会） |
| その他   |   |

投与スケジュール

| Day ( 1 ) |  |                            |                |
|-----------|--|----------------------------|----------------|
| 滴下順       | 手技・薬品名・規格  | 用量                         | 投与時間           |
| 1         | 点滴末梢 メイン1<br>生理食塩液250mL<br><br>1日1回 (持続)           | 1本                         | 持続             |
| 2         | 点滴末梢 メイン1側管1<br>生理食塩液50mL<br>ポララミン注5mg<br><br>1日1回 | 1本<br>1本                   | 15分            |
| 3         | 点滴末梢 メイン1側管1<br>生理食塩液250mL<br>ハーセプチン注<br><br>1日1回  | 1本<br>初回4mg/kg<br>以降2mg/kg | 初回90分<br>以降30分 |