

| | |
|---------|------------|
| レジメン名 | PTX アジュバント |
| 対象疾患 | 乳癌 アジュバント |
| 1クールの日数 | 7日 |
| 目標コース数 | 12コース |

| | 抗がん剤名 | 略号 | 1日投与量 | 単位 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|-------|-----|-------|-------------------|------|------|-----|
| 1 | タキソール | PTX | 80 | mg/m ² | div | 1時間 | d1 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 補足 | | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 催吐リスク | 軽度 |
| 前投薬 | グラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg、ファモチジン注20mg、ポララミン注5mg |
| 減量規定 | タキソール：各クール開始時、白血球数3,000/mm ³ 未満または好中球数1,500/mm ³ 未満であれば、骨髄機能が回復するまで投与を延期（同一クール内では白血球数2,000/mm ³ 未満または好中球数1,000/mm ³ 未満）。 白血球数1,000/mm ³ 未満、重篤な末梢神経障害が発現した場合は次回より減量。 |
| 主な副作用 | 悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫 |
| 参考文献 | 適正使用ガイド（タキソール） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会） |
| その他 | インラインフィルター使用 |

投与スケジュール

| Day (1) | | | |
|-----------|---|---------------------------|------|
| 滴下順 | 手技・薬品名・規格 | 用量 | 投与時間 |
| 1 | 点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続) | 1本 | 持続 |
| 2 | 点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg ファモチジン注20mg ポララミン注5mg デカドロン注6.6mg 1日1回 | 1本 1本 1本 1本 | 15分 |
| 3 | 点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL タキソール注 1日1回 投与前30分空ける インラインフィルター使用 | 1本 80mg/m ² | 1時間 |