

レジメン名	GEM
対象疾患	膵癌、胆道癌
1クールの日数	28日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m ²	div	30分	d1,8,15
2							
3							
4							
5							
6							
補足							

催吐リスク	軽度
前投薬	デカドロン注6.6mg
減量規定	ゲムシタビン：白血球数2,000/mm ³ 未満、または血小板数が70,000/mm ³ 未満で投与延期し、骨髄機能が回復後、適宜減量し再開。
主な副作用	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、発疹
参考文献	適正使用ガイド（ジェムザール） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	ゲムシタビン：30分かけて点滴静注を行う（60分以上かけて行うと副作用が増強した報告あり）

投与スケジュール

Day (1,8,15)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL デカドロン注6.6mg 1日1回	1本 1本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL ゲムシタビン注 1日1回	1本 1000mg/m ²	30分