

レジメン名	Trastuzumab emtansine (T-DM1)
対象疾患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌 ※タキサン系及びTmab治療経験のある症例のみ
1クールの日数	21日
目標コース数	病勢進行が認められるまで

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	カドサイラ	T-DM1	3.6	mg/kg	div	下記参照	d1
2							
3							
4							
5							
6							
補足	カドサイラの投与時間は初回投与時90分で行う。忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮可能						

催吐リスク	軽度
前投薬	グラニセトロン注、デカドロン注6.6mg
減量規定	左室駆出率(LVEF)、AST、ALT、総ビリルビン、血小板、末梢神経症状に関して減量・中止基準あり ※詳細は適正ガイドライン参照 ※減量目安：1段階減量…3.0mg/kg、2段階減量…2.4mg/kg、3段階減量…中止 ※減量後に再度増量はしない
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、重度の出血、肝機能障害、末梢神経症状、Infusion reaction、咳嗽、息切れ、動悸
参考文献	適正使用ガイド（カドサイラ） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	インラインフィルター使用

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg 1日1回	1本 1本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL カドサイラ注 1日1回 インラインフィルター使用	1本 3.6mg/kg	初回90分 以降30分