

| | |
|---------|---------|
| レジメン名 | GEM+S-1 |
| 対象疾患 | 膵臓癌、胆道癌 |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 目標コース数 | 可能な限り継続 |

| | 抗がん剤名 | 略号 | 1日投与量 | 単位 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|---|-----|-------|-------------------|------|------|----------|
| 1 | ゲムシタビン | GEM | 1000 | mg/m ² | div | 30分 | d1,8 |
| 2 | エスワン | S-1 | 下記参照 | | po | | d1夕～d15朝 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 補足 | エスワンの1日量…1.25m ² 未満：80mg 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：100mg 1.5m ² 以上：120mg (最高75mg/回、最低40mg/回) | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 催吐リスク | 中等度 |
| 前投薬 | グラニセトロン注3mg、デカドロン注9.9mg |
| 減量規定 | ゲムシタビン：白血球数2,000/mm ³ 未満、または血小板数が70,000/mm ³ 未満で投与延期し、骨髄機能が回復後、適宜減量し再開 エスワン：腎障害（Ccr60以上80未満；必要に応じて1段階減量、Ccr30以上60未満；1段階以上の減量、30～40未満は2段階減量が望ましい） |
| 主な副作用 | 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感、発疹、口内炎、味覚異常、下痢、色素沈着、流涙 |
| 参考文献 | 適正使用ガイド（ジェムザール、ティーエスワン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会） |
| その他 | ゲムシタビン：30分かけて点滴静注を行う（60分以上かけて行うと副作用が増強した報告あり） |

投与スケジュール

| Day (1,8) | | | |
|-------------|---|-----------------------------|------|
| 滴下順 | 手技・薬品名・規格 | 用量 | 投与時間 |
| 1 | 点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続) | 1本 | 持続 |
| 2 | 点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg デカドロン注1.65mg 1日1回 | 1本 1本 2本 | 15分 |
| 3 | 点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL ゲムシタビン注 1日1回 | 1本 1000mg/m ² | 30分 |